

## NOTA / NOTE

### *Platycerus spinifer* Schaufuss, 1862 (Coleoptera, Lucanidae), un nuevo lucánido para la fauna de Cáceres (Extremadura, España).

Jorge Luis Agoiz-Bustamante <sup>1</sup> & Ángel Blázquez Caselles <sup>2</sup>

<sup>1</sup> c/ Azcona Gamen, 6, 1ºC. E-31500 Tudela (NAVARRA, ESPAÑA). e-mail: jorgelagoiz@telefonica.net

<sup>2</sup> c/ Esparraguera, 45. E-10600 Plasencia (CÁCERES, ESPAÑA). e-mail: abcaselles@gmail.com

**Resumen:** Se cita *Platycerus spinifer* Schaufuss, 1862, por primera vez de la provincia de Cáceres (Extremadura, España).

**Palabras clave:** Coleoptera, Lucanidae, *Platycerus spinifer*, Cáceres, Extremadura, España.

**Abstract:** *Platycerus spinifer* Schaufuss, 1862 (Coleoptera, Lucanidae), a new lucanid beetle for the Cáceres entomological fauna (Extremadura, Spain). *Platycerus spinifer* Schaufuss, 1862 is recorded for the first time from Cáceres (Extremadura, Spain).

**Key words:** Coleoptera, Lucanidae, *Platycerus spinifer*, Cáceres, Extremadura, Spain.

**Recibido:** 9 de octubre de 2011

**Aceptado:** 10 de octubre de 2011

**Publicado on-line:** 17 de octubre de 2011



Foto 1. - Habitus de *Platycerus spinifer* Schaufuss, 1862.

*Platycerus spinifer* Schaufuss, 1862 (habitus, foto 1) es un lucánido endémico de la Península Ibérica y Francia (LÓPEZ-COLÓN, 2000). En la Península están presentes tres especies del género: *P. caprea* (DeGeer, 1774), *P. caraboides* (Linneo, 1758) y *P. spinifer* Schaufuss, 1862.

Su distribución ibérica conocida es fundamentalmente el centro-norte de la Península. Hay registros de Albacete, Asturias, Ávila, Barcelona, Cantabria, La Coruña, Gerona, Granada, Guadalajara, Jaén, León, Lérida, Lugo, Madrid, Murcia, Orense, Palencia, Pontevedra, La Rioja, Segovia, Tarragona, Teruel y Zaragoza, estando citada además de Portugal (BÁGUENA, 1967; LÓPEZ-COLÓN *et al.*, 1996; PÉREZ MORENO & CABRERO SAÑUDO, 1999; LÓPEZ-COLÓN, 2000).

Como se puede observar, su presencia en el sur de la Península Ibérica es muy escasa, limitándose a las citas de Granada, Jaén y Murcia. En la provincia de Cáceres, hemos tenido oportunidad de estudiar ejemplares de tres localidades bien alejadas entre sí y en ambientes diferentes. Los datos de captura se aportan a continuación:

**Cáceres:** Puerto del Hospital, Navalvillar de Ibor, 1.091 m., 30STJ98, 16 de Mayo de 1992, 1 macho (A. Blázquez leg. y col.); Puerto Honduras, Gargantilla, 1.435 m., 30TTK55, 6 de Junio de 1996, 1 macho (A. Blázquez leg., J.L. Agoiz col.); Villanueva de la Vera, 600 m., 30TTK94, 13 de Junio de 1998, 1 macho, (A. Blázquez leg y col.).

La primera localidad, al sureste de la provincia, en la Sierra de las Villuercas, próxima ya a Ciudad Real; la segunda, en el Valle del Ambroz, al norte de la provincia y la tercera en las estribaciones cacereñas del Sistema Central, en la comarca de La Vera (Mapa 1).

Con estas nuevas citas de la provincia de Cáceres, se amplía la distribución de *P. spinifer* en España, añadiéndose una nueva especie a la fauna de lucánidos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.


## Bibliografía

BÁGUENA, L. 1967. *Scarabaeoidea de la fauna Ibero-Balear y Pirenaica*. Instituto Español de Entomología, C.S.I.C. Madrid, 567 pp.

LÓPEZ-COLÓN, J.I. 2000. *Familia Lucanidae*, pp.: 43-64. En: *Coleoptera, Scarabaeoidea I*. MARTÍN-PIERA, F. & LÓPEZ-COLÓN, J.I. 2000. *Fauna Ibérica*, vol. 14. RAMOS, M.A. et al. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. Madrid.

LÓPEZ-COLÓN, J.I.; GONZÁLEZ PEÑA, C.F. & BELTRÁN VALEN, J.R. 1996. *Insecta: Coleoptera*, 10 (Familia 32): Scarabaeoidea. Familia: Lucanidae. *Catalogus de la Entomofauna aragonesa*, 12 (1996): 15-20.

PÉREZ MORENO, I. & CABRERO SAÑUDO, F.J. 1999. Datos para el catálogo de coleópteros de La Rioja (*Insecta, Coleoptera*). *Zubía, Monográfico*, 11: 93-126.



Mapa 1.- Mapa UTM de la provincia de Cáceres, con las citas aportadas en esta nota (●).