

## NOTA / NOTE

Primeros registros de *Lycaena bleusei* Oberthür, 1884 para Galicia (N.O. España) (Lepidoptera: Lycaenidae).Hipólito Hernández Martín<sup>1</sup> & J. Carlos Vicente Arranz<sup>2</sup><sup>1</sup> Casa Forestal s/n. E-49350 El Puente de Sanabria, Galende (Zamora, ESPAÑA). e-mail: poherma@hotmail.com<sup>2</sup> PROFENAT: Proyectos Fotográficos y Estudios de Naturaleza - c/ Witerico, 9A - Bajo B. E-28025 Madrid (ESPAÑA). e-mail: fotobichos@yahoo.es

**Resumen:** Se constata por primera vez la presencia de *Lycaena bleusei* Oberthür, 1884 (Lepidoptera: Lycaenidae) en la Comunidad Autónoma de Galicia, noroeste de España, concretamente en la provincia de Ourense.

**Palabras clave:** Lepidoptera, Lycaenidae, *Lycaena bleusei*, Ourense, Galicia, faunística.

**Abstract:** First records of *Lycaena bleusei* Oberthür, 1884 for Galicia (NW Spain) (Lepidoptera: Lycaenidae). The occurrence of *Lycaena bleusei* Oberthür, 1884 (Lepidoptera: Lycaenidae) in the Autonomous Community of Galicia (NW Spain), specifically in the province of Ourense, is reported for the first time.

**Key words:** Lepidoptera, Lycaenidae, *Lycaena bleusei*, Ourense, Galicia, faunistics.

**Recibido:** 25 de septiembre de 2016

**Publicado on-line:** 6 de octubre de 2016

**Aceptado:** 1 de octubre de 2016

El género *Lycaena* Fabricius, 1807 estaba representado en Galicia hasta la presente nota por cinco taxones diferentes: *Lycaena alciphron* (Rottemburg, 1775), *L. hippothoe* (Linnaeus, 1760), *L. phlaeas* (Linnaeus, 1760), *L. tityrus* (Poda, 1761) y *L. virgaureae* (Linnaeus, 1758) (GARCÍA-BARROS *et al.*, 2013).

*Lycaena bleusei* Oberthür, 1884 es un endemismo ibérico que hasta hace relativamente no mucho tiempo estaba considerado como una simple subespecie alopátrica de *L. tityrus*, y cuya distribución se limitaba al área central peninsular (GARCÍA-BARROS *et al.*, 2013).

En un reciente estudio realizado por los autores (VICENTE ARRANZ *et al.*, 2015) se confirmó la amplia presencia de *L. bleusei* en el noroeste peninsular, concretamente en el noroeste de Zamora y el norte de Portugal. En este mismo trabajo, ya se avanzaba la posible aparición de este taxón en algún punto del área gallega limítrofe a Zamora con un hábitat similar al de donde esta especie está presente.

A raíz de este estudio se han visitado durante 2016 y en diferentes ocasiones algunas zonas del territorio gallego limítrofes a la provincia de Zamora con Ourense, concretamente de la comarca de Viana. Como resultado de estas visitas, se ha podido constatar la presencia de *L. bleusei* (Fig. 1) en dos ocasiones (31/08/2016 y 16/09/2016), en el municipio de A Mezquita (29TPG65), a una cota situada entre los 980-1000 m de altitud (Hipólito Hernández leg.). El hábitat utilizado por la especie es similar al que utiliza en la vecina provincia de Zamora, bordes de caminos y pastizales secos, y zonas abiertas con hierba alta en áreas de robledal de roble melojo (*Quercus pyrenaica*) del piso supramediterráneo. Aparece también cerca de cursos de agua donde crecen acederas (*Rumex* sp.), planta nutricia de las larvas de la especie considerada. En ambas ocasiones se observaron diferentes individuos de ambos sexos que no fueron capturados, pero de los que se obtuvieron diferentes fotografías para documentar este hecho.

Es muy posible que intensificando los muestreos en áreas favorables esta nueva especie aparezca en otros puntos de la provincia de Ourense, pues creemos debe estar más extendida en dicho territorio, donde ha pasado desapercibida hasta ahora quizás confundida con su congénere *L. tityrus*. Es en las comarcas orensanas de Valdeorras, Viana y Verín donde hay mayores posibilidades de que aparezca *L. bleusei*, pues existen espacios propicios y hábitats similares a los utilizados habitualmente por esta especie.

Se amplía por tanto de nuevo la distribución de este taxón en el noroeste peninsular, verificando su presencia en la Comunidad Autónoma de Galicia, concretamente en el sureste de la provincia de Ourense (Fig. 2).



### Agradecimientos

Antonio García y Beatriz Parra nos ayudaron en la elaboración del mapa de distribución. Este estudio no ha contado con ninguna ayuda económica y ha sido costeadado íntegramente por sus autores.

### Bibliografía

GARCÍA-BARROS, E.; MUNGUIRA, M.L.; STEFANESCU, C. & VIVES MORENO, A. 2013. *Lepidoptera: Papilionoidea*. En: *Fauna Ibérica*, vol. 37. Ramos, M.A. et al. (eds). Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC. Madrid, 1213 pp.

VICENTE ARRANZ, J.C.; HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J.A.; HERNÁNDEZ MARTÍN, H. & PARRA ARJONA, B. 2015. Primeros registros de *Lycaena bleusei* Oberthür, 1884 en Valladolid y Zamora (Castilla y León: España), y Bragança (Portugal) (Lepidoptera: Lycaenidae). *Archivos Entomoloxicos*, 14: 227-234.




Fig. 1. - *Lycaena bleusei* en A Mezquita (Ourense).

Fig. 2. - Distribución conocida de *Lycaena bleusei* en Galicia.